



Días de enfermedad-Excepciones

Como padre de familia, habrá ocasiones en las que no sepa si deba mandar a su hijo a la escuela o llevarlo al médico. Por lo general, los niños y jóvenes de edad escolar son un grupo de personas saludables y fuertes. Se puede esperar que un alumno tenga de 2 a 9 resfriados por año. Excluyendo los exámenes médicos de rutina, las enfermedades infecciosas representan el 40% de todas las visitas de los niños y jóvenes al médico.

Esta lista sirve de guía únicamente. Todos los estudiantes serán evaluados uno por uno por la enfermera escolar. La decisión de enviar a casa a su hijo se realizará según el juicio profesional de la enfermera de la escuela. El objetivo es mantener a los alumnos seguros y sanos.

¿Cuándo debe dejar a su hijo en casa?

Síntoma	¿Debe permanecer el niño en casa?
Fiebre: Temperatura de 100.4 F o más alta.	Sí- cuando se acompaña de cambios de comportamiento u otros síntomas ejemplo: erupción, dolor de garganta, dolor de estómago / vómito, diarrea, tos, dolor de cabeza, dolor de oído. Para regresar a la escuela, el alumno no debe tener fiebre (temperatura oral menor de 99 grados F) es decir, sin el uso de medicamentos para bajar la fiebre por un día completo (24Horas)
Vómito: Dos o más vómitos en 24 horas.	Sí- hasta que deje de vomitar (no vómitos en 24 horas seguidas). Se deben observar otras señales de enfermedad o de deshidratación.
Diarrea: Heces frecuentes, sueltas o acuosas en comparación con el patrón normal del niño; que no sean causados por dieta o medicamentos.	Sí- si el niño se ve o actúa enfermo; si el niño tiene diarrea con temperatura de 100 grados Fahrenheit.

Enfermedad	
Conjuntivitis:	Sí- hasta que la secreción y las señales de

Color rosado/rojizo de la parte blanca del ojo con secreción gruesa que puede ser de color amarillo o verdoso.	infección se hayan consumado o cuando se termine un tratamiento de 24 horas con solución oftálmica prescrita por el médico.
Impétigo: Lesión como ampolla que se convierte en pústulas. Puede “exudar” y tener costra.	Sí- por 24 horas después de que el tratamiento médico se haya iniciado. Nota: La lesión debe permanecer cubierta cuando asista a clases.
Tiña/roña Infección común de la piel generalmente de color rojo, que da comezón y sarpullido circular escamoso.	NO- cuando se inicie un tratamiento Nota: La lesión debe permanecer cubierta cuando asista a clases.
Erupción con fiebre: Cualquier erupción acompañada de fiebre.	Sí- cuando se requiera de ver a un médico. Podrá retornar cuando ya no haya erupción o bien cuando el médico lo indique.
Herida abierta: Cualquier herida abierta, lesión que segregue o pústula en la piel.	Sí- cuando la herida segregue y no se pueda parar con un curita o heridas que aumenten de tamaño o heridas que requieran ser evaluadas por el médico.
Otro Síntomas que prevén al alumno de participar activamente en las actividades escolares o que el alumno requiera de más cuidados que la escuela pueda proporcionar.	Sí- cuando el medico lo indique.

Consulte a su médico de inmediato si tiene alguna duda sobre la condición de su hijo. Siga las instrucciones del médico o de la enfermera escolar antes de regresar a clases.

Referencia:

National Institutes of Health
Centers for Disease Control and Prevention
December 2016