



Building Excellence

Health Services

Días de enfermedad-Excepciones

Como padre de familia, habrá ocasiones en las que no sepa si deba mandar a su hijo a la escuela o llevarlo al médico. Por lo general, los niños y jóvenes de edad escolar son un grupo de personas saludables y fuertes. Se puede esperar que un alumno tenga de 2 a 9 resfriados por año. Excluyendo los exámenes médicos de rutina, las enfermedades infecciosas representan el 40% de todas las visitas de los niños y jóvenes al médico.

Esta lista sirve de guía únicamente. Todos los estudiantes serán evaluados uno por uno por la enfermera escolar. La decisión de enviar a casa a su hijo se realiza el juicio profesional de la enfermera de la escuela. El objetivo es mantener a los alumnos seguros y sanos.

¿Cuándo debe dejar a su hijo en casa?

Síntoma	¿Debe permanecer el niño en casa?
<p>Fiebre: Temperatura de 100.4 F o más alta.</p>	<p>Sí- cuando se acompaña de cambios de comportamiento u otros síntomas ejemplo: erupción, dolor de garganta, dolor de estómago / vómito, diarrea, tos, dolor de cabeza, dolor de oído. Para regresar a la escuela, el alumno no debe tener fiebre (temperatura oral menor de 100.4 grados F) es decir, sin el uso de medicamentos para bajar la fiebre por un día completo (72 Horas)</p>
<p>Vómito: Dos o más vómitos en 24 horas.</p>	<p>Sí- hasta que deje de vomitar (no vómitos en 24 horas seguidas). Se deben observar otras señales de enfermedad o de deshidratación.</p>
<p>Diarrea: Heces frecuentes, sueltas o acuosas en comparación con el patrón normal del niño que no sean causados por dieta o medicamentos.</p>	<p>-si el niño se ve o actúa enfermo; si el niño tiene diarrea con temperatura de 100 grados Fahrenheit.</p>

Enfermedad	
<p>Conjuntivitis: Color rosado/rojizo de la parte blanca del ojo con secreción gruesa que puede ser de color amarillo o verdoso.</p>	<p>Sí- hasta que la secreción y las señales de infección se hayan consumado o cuando se termine un tratamiento de 24 horas con solución oftálmica prescrita por el médico.</p>
<p>Impétigo: Lesión como ampolla que se convierte en pústulas. Puede “exudar” y tener costra.</p>	<p>Sí- por 24 hora después de que el tratamiento médico se haya iniciado Nota: La lesión debe permanecer cubierta cuando asista a clases.</p>
<p>Tiña/roña Infección común de la piel generalmente de color rojo, que da comezón y sarpullido circular escamoso</p>	<p>-cuando se inicie un tratamiento Nota: La lesión debe permanecer cubierta cuando asista a clases.</p>
<p>Erupción con fiebre: Cualquier erupción acompañada de fiebre.</p>	<p>- cuando se requiera de ver a un médico. Podrá retornar cuando ya no haya erupción o bien cuando el médico lo indique</p>
<p>Herida abierta: Cualquier herida abierta, lesión que segregue o pústula en la piel.</p>	<p>- cuando la herida segregue y no se pueda parar con un curita o heridas que aumenten de tamaño o heridas que requieran ser evaluadas por el médico.</p>
<p>Otro Síntomas que prevén al alumno de participar activamente en las actividades escolares o que el alumno requiera de más cuidados que la escuela pueda proporcionar.</p>	<p>cuando el médico lo indique.</p>

Nota: Esta lista sirve como pautas en la gestión de estudiantes y no es inclusiva. Todos los estudiantes serán evaluados caso por caso por la enfermera de la escuela. El objetivo es mantener a nuestros estudiantes seguros y saludables.

Consulte a su médico de inmediato si tiene alguna duda sobre la condición de su hijo. Siga las instrucciones del médico de su hijo. Según la política del BCBE, ningún niño puede asistir a clase a menos que no tenga fiebre durante 72 horas sin medicamentos o un aclaramiento físico.

Fuente: Academia Estadounidense de Pediatría Noviembre 2015 Revisado 7/2020